

# MITTLERER SCHULABSCHLUSS AN DER MITTELSCHULE 2015

## MATHEMATIK

24. Juni 2015

8:30 Uhr – 11:00 Uhr

Platznummer (ggf. Name/Klasse): \_\_\_\_\_

Die Benutzung von für den Gebrauch an der Mittelschule zugelassenen **Formelsammlungen** bzw. **Taschenrechnern** ist während der gesamten Prüfung **erlaubt** (vgl. KMS vom 12.02.2014 Nr. IV.2 – S 7500 – 4. 4272).

Ergebnisse können nur dann bewertet werden, wenn sowohl der **Lösungsweg** als auch die **Teilergebnisse** aus dem Lösungsblatt ersichtlich sind und sich das Ergebnis daraus ableiten lässt.

Jeder Prüfling muss **die eine** vom Prüfungsausschuss ausgewählte **Aufgabengruppe** bearbeiten.

<b>Gesamtbewertung</b>		Erst- korrektur	Zweit- korrektur
<b>Aufgabengruppe I <u>oder</u> II</b>	45 Punkte		

Note

<b>Notenstufen</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>Punkte</b>	45 – 38	37,5 – 31	30,5 – 23	22,5 – 15	14,5 – 7	6,5 – 0

**Erstkorrektur:**

\_\_\_\_\_ (Datum, Unterschrift)

**Zweitkorrektur:**

\_\_\_\_\_ (Datum, Unterschrift)

**Bemerkung:**

\_\_\_\_\_

## Aufgabengruppe I

Punkte

1. Gegeben ist die Gerade  $g_1$  mit der Funktionsgleichung  $y = 0,5x + 1$ .
  - a) Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunkts A von  $g_1$  mit der x-Achse.
  - b) Die Gerade  $g_2$  verläuft durch den Punkt P (1 | 3) und ist parallel zu  $g_1$ . Bestimmen Sie die Gleichung von  $g_2$  rechnerisch.
  - c) Die Gerade  $g_3$  verläuft durch den Punkt Q (2 | 4) und schneidet  $g_1$  senkrecht. Ermitteln Sie die Gleichung von  $g_3$  rechnerisch.
  - d) Zeichnen Sie die Geraden  $g_1$ ,  $g_2$  und  $g_3$  in ein Koordinatensystem mit der Längeneinheit 1 cm.
  - e) Die Gerade  $g_1$  schneidet die Gerade  $g_4$ :  $y = -1,5x + 7$ . Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunkts T.
  - f) Auf der Geraden  $g_5$  liegen die Punkte B (-4 | 2) und C (0,5 | -7). Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von  $g_5$  rechnerisch.
  - g) Berechnen Sie die Größe des spitzen Winkels  $\alpha$ , den die Gerade  $g_1$  mit der x-Achse einschließt.


9

2. Für die folgende Skizze gilt:  $g_1$ ,  $g_2$  und  $g_3$  sind zueinander parallel. Schreiben Sie die folgenden Gleichungen auf Ihr Lösungsblatt und ersetzen Sie die Platzhalter [ ] so, dass die Streckenverhältnisse richtig wiedergegeben werden.

a)  $\frac{d+e}{h} = \frac{e}{[ ]}$

b)  $\frac{a}{[ ]} = \frac{[ ]}{e}$

c)  $\frac{m}{h} = \frac{c}{[ ]}$



3

3. Geben Sie die Definitionsmenge der folgenden Gleichung an und ermitteln Sie die Lösungsmenge rechnerisch.

$$\frac{4x}{3x+7} + \frac{4}{6+2x} = 1 - \frac{x}{3x+7}$$

4

Fortsetzung nächste Seite


4. Mobilfunkanbieter A hatte vor drei Jahren 1 600 000 Kunden und wollte seine Kundenzahl jährlich um 5 % erhöhen.
- Berechnen Sie, wie viele Kunden der Anbieter in diesem Fall heute hätte.
  - Tatsächlich stieg die Zahl der Kunden nur im ersten Jahr um 5 %. In den folgenden zwei Jahren nahm die Zahl sogar um jährlich 1 % ab. Berechnen Sie die Zahl der Kunden nach diesen 3 Jahren.
  - Bei Mobilfunkanbieter B wächst die Zahl der Kunden jährlich um 6 %. Berechnen Sie, nach wie vielen Jahren sich bei gleichbleibendem Wachstum die Zahl der Kunden verdoppeln wird.
  - Ermitteln Sie rechnerisch, wie hoch das durchschnittliche jährliche Wachstum bei Mobilfunkanbieter B sein müsste, um die Zahl von 800 000 Kunden in drei Jahren auf 1 Million zu erhöhen.

5

5. Aus einem Stück Bronze mit einer Masse von 181,7 kg wird ein halbkugelförmiges Becken mit einem Außendurchmesser von 7,5 dm gegossen (siehe Skizze). 1 dm<sup>3</sup> Bronze wiegt 8,8 kg.

Berechnen Sie die Wandstärke  $s$  des Beckens.

Hinweis:  
Skizze nicht  
maßstabsgetreu



4

6. Die nach unten geöffnete Normalparabel  $p_1$  hat den Scheitelpunkt  $S_1(0,5 | 4)$ .
- Ermitteln Sie rechnerisch die Normalform der Parabel  $p_1$ .
  - Die Parabel  $p_2: y = -x^2 + 4x + 5$  schneidet die  $x$ -Achse in den Punkten  $N_1$  und  $N_2$ . Berechnen Sie die Koordinaten dieser beiden Nullstellen.
  - Ermitteln Sie rechnerisch den Scheitelpunkt  $S_2$  von  $p_2$ .
  - Die Gerade  $g: y = 2x - 3$  schneidet die Parabel  $p_2$  in den Punkten  $P$  und  $Q$ . Berechnen Sie die Koordinaten der beiden Schnittpunkte.
  - Zeichnen Sie die Parabeln  $p_1$  und  $p_2$  in ein Koordinatensystem mit der Längeneinheit 1 cm.
  - Geben Sie die Scheitelpunktform einer beliebigen nach unten geöffneten Normalparabel  $p_3$  an, die keinen Schnittpunkt mit der Parabel  $p_1$  hat.

6

Fortsetzung nächste Seite

7. Ersetzen Sie die Platzhalter [ ] durch „=“ oder „≠“ und schreiben Sie die vollständigen Ausdrücke auf Ihr Lösungsblatt. Es gilt immer:  $x \neq 0$

a)  $2x\sqrt{6x^2}$  [ ]  $x\sqrt{3}$

b)  $\frac{x^{-2}}{x^{-3}} \cdot \sqrt{3}$  [ ]  $x\sqrt{3}$

2

8. In einem Losbehälter befinden sich 60 Lose, davon sind 15 Gewinnlose (G), der Rest Nieten (N). Frau Stenzel zieht zwei Lose und öffnet sie nacheinander.


a) Erstellen Sie ein Baumdiagramm und beschriften Sie die Äste mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.

b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass bei den zwei gezogenen Losgen genau ein Gewinn dabei ist.

3

9. Im abgebildeten Dreieck ABC (siehe Skizze) gilt folgendes Verhältnis:

$$\overline{EB} : \overline{BC} = 1 : 3$$



Hinweis:  
Skizze nicht  
maßstabsgetreu


a) Berechnen Sie die Größe des Winkels  $\epsilon$ .

b) Berechnen Sie den Umfang des Dreiecks AEC.

Hinweis: Es ist sinnvoll, Zwischen- und Endergebnisse auf zwei Dezimalstellen zu runden.

5

10. Lisas Aquarium ist doppelt so lang wie hoch (siehe Skizze).



Hinweis:  
Skizze nicht  
maßstabsgetreu

Lisa füllt das Aquarium bis 10 cm unter den Rand mit Wasser und braucht dafür 72 Liter. Ermitteln Sie rechnerisch die Länge  $a$  und die Höhe  $c$  des Aquariums.

4

**Summe: 45**

## Aufgabengruppe II

Punkte

1. Die Gerade  $g_1$  verläuft durch die Punkte A (2 | 4) und B (-6 | 8).
  - a) Bestimmen Sie die Funktionsgleichung von  $g_1$  rechnerisch.
  - b) Die Gerade  $g_2$  hat die Funktionsgleichung  $y = -0,5x - 2$ .  
Die Gerade  $g_3$  geht durch den Punkt C (4 | 5) und steht senkrecht auf  $g_2$ .  
Ermitteln Sie rechnerisch die Funktionsgleichung von  $g_3$ .
  - c) Berechnen Sie die Koordinaten des Schnittpunkts N der Geraden  $g_2$  mit der x-Achse.
  - d) Der Punkt D (-15 | y) liegt auf der Geraden  $g_2$ .  
Berechnen Sie die y-Koordinate des Punktes D.
  - e) Die Gerade  $g_4$  mit der Funktionsgleichung  $y = x + 1$  schneidet die Gerade  $g_2$  im Punkt E. Berechnen Sie die Koordinaten des Punktes E.
  - f) Zeichnen Sie die Geraden  $g_2$ ,  $g_3$  und  $g_4$  in ein Koordinatensystem mit der Längeneinheit 1 cm.


8

2. Geben Sie die Definitionsmenge der folgenden Gleichung an und berechnen Sie deren Lösungsmenge.

$$\frac{2x - 1}{x} - \frac{3 + x}{3 - x} = -\frac{3}{x} + 2$$

4

3. In einem rechtwinkligen Dreieck ABC sind die Längen der Strecken [AD] und [BC] bekannt (siehe Skizze).



Hinweis:  
Skizze nicht  
maßstabsgetreu

- a) Berechnen Sie die Länge der Strecke [BD].
- b) Ermitteln Sie den Flächeninhalt des Dreiecks ABC rechnerisch.  
Hinweis: Rechnen Sie mit  $\overline{BD} = 9,0$  cm.
- c) Berechnen Sie die Größe des Winkels  $\beta$ .
- d) Ermitteln Sie rechnerisch den Umfang des Dreiecks ADE.  
Hinweis: Es ist sinnvoll, Zwischen- und Endergebnisse auf eine Dezimalstelle zu runden.

6

Fortsetzung nächste Seite

4. Die nach oben geöffnete Normalparabel  $p_1$  verläuft durch die Punkte A (2 | 3) und B (4 | -1).
- Bestimmen Sie rechnerisch die Funktionsgleichung von  $p_1$  in der Normalform.
  - Eine nach unten geöffnete Normalparabel  $p_2$  hat den Scheitelpunkt  $S_2$  (3 | 4). Ermitteln Sie rechnerisch die Funktionsgleichung von  $p_2$  in der Normalform.
  - Die Normalparabel  $p_3$  hat die Funktionsgleichung  $y = x^2 + 2x - 3$ . Bestimmen Sie rechnerisch die Koordinaten der Schnittpunkte  $N_1$  und  $N_2$  von  $p_3$  mit der x-Achse.
  - Die Normalparabel  $p_4$  hat die Funktionsgleichung  $y = -x^2 + 2x + 5$ . Berechnen Sie die Koordinaten der Schnittpunkte C und D der Parabeln  $p_3$  und  $p_4$ .
  - Bestimmen Sie die Koordinaten des Scheitelpunkts  $S_3$  der Parabel  $p_3$  rechnerisch.
  - Zeichnen Sie  $p_3$  in ein Koordinatensystem mit der Längeneinheit 1 cm.


7

5. Schreiben Sie die folgenden Gleichungen auf Ihr Lösungsblatt und ersetzen Sie die Platzhalter [ ] so, dass die Streckenverhältnisse richtig wiedergegeben werden. Es gilt:  $g_1 \parallel g_2$

a)  $\frac{c}{a} = \frac{d}{[ ]}$

b)  $\frac{f}{[ ]} = \frac{a+b}{a}$

c)  $\frac{c+d}{c} = \frac{[ ]}{a}$



3

6. Das radioaktive Element Strontium-90 hat eine Halbwertszeit von 20 Jahren.
- Wie viele Milligramm Strontium-90 sind bei einer Ausgangsmenge von 500 mg nach 80 Jahren noch vorhanden? Berechnen Sie.
  - Ermitteln Sie rechnerisch, nach wie vielen Jahren von 500 mg Strontium-90 nur noch 1 mg vorhanden ist.
  - Berechnen Sie den durchschnittlichen jährlichen Zerfall von Strontium-90 in Prozent.

4

Fortsetzung nächste Seite

7. Bei einem Kugelstoßwettbewerb ist für Männer eine 6 kg schwere Kugel vorgesehen.

$1 \text{ cm}^3$  der Kugel wiegt 7,5 Gramm.

- Berechnen Sie den Durchmesser dieser Kugel.
- Frauen verwenden eine leichtere Kugel. Die Volumina der beiden Kugeln stehen im Verhältnis 2 : 3.  
Berechnen Sie den Durchmesser der leichteren Kugel.

Hinweis: Es ist sinnvoll, Zwischen- und Endergebnisse auf eine Dezimalstelle zu runden.

3

8. Bei einem Preisrätsel für die Jahrgangsstufe 9 einer Mittelschule haben 7 Jugendliche der Klasse 9a, 12 Jugendliche der Klasse 9b sowie 11 Jugendliche der Klasse 9c die richtige Lösung abgegeben. Unter diesen werden zwei Preise verlost.

- Mit welchen Wahrscheinlichkeiten verteilen sich die beiden Preise auf die drei Klassen?  
Erstellen Sie ein Baumdiagramm und beschriften Sie die Äste mit den jeweiligen Wahrscheinlichkeiten.
- Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass beide Preise an Jugendliche der Klasse 9a gehen.
- Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeit, dass die Schülerinnen und Schüler der Klasse 9c keinen Preis erhalten.

4

9. Folgende Gleichungen stellen Binome dar.

Ersetzen Sie die Platzhalter und schreiben Sie die vollständigen Gleichungen auf Ihr Lösungsblatt. ( $\textcircled{?}$  → Rechenzeichen;  $\boxed{?}$  → Term)

a)  $(4ab - 6 \boxed{?})^2 = \boxed{?} a^2 b^2 \textcircled{?} \boxed{?} abc^2 d^2 + 36c^4 d^4$

b)  $(\boxed{?} - 25c^2) \cdot (\boxed{?} + 25c^2) = 196a^2 \textcircled{?} \boxed{?}$

4


10. Notieren Sie auf Ihrem Lösungsblatt, ob die jeweilige Behauptung richtig (r) oder falsch (f) ist.

a)  $\overline{BC}^2 = \overline{AB} \cdot \overline{AP}$

b)  $\sin \alpha = \overline{CP} : \overline{AC}$

c)  $\cos \alpha \cdot \overline{AP} = \overline{QP}$

d)  $\triangle ABC$  ist ähnlich  $\triangle BCP$



2

Summe: 45