A 2.0 Die Strecke $\overline{BC}$ mit dem Mittelpunkt M ist die Basis des gleichschenkligen Dreiecks ABC. Dieses Dreieck ist die Grundfläche der Pyramide ABCS mit der Höhe $\overline{MS}$.

Es gilt: $|\overline{BC}| = 10 \text{ cm}$; $|\overline{AM}| = 9 \text{ cm}$; $|\overline{MS}| = 7 \text{ cm}$.

Die Zeichnung zeigt ein Schrägbild der Pyramide ABCS.

In der Zeichnung gilt: $q = \frac{1}{2}$; $\omega = 45^\circ$; $\overline{AM}$ liegt auf der Schrägbildachse.

Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma.

A 2.1 Berechnen Sie das Maß des Winkels ASM.

[Ergebnis: $\sphericalangle ASM = 52,13^\circ$]

1 P

A 2.2 Punkte P_n liegen auf der Strecke $\overline{AS}$. Die Winkel $\sphericalangle SMP_n$ haben das Maß φ mit $\varphi \in]0^\circ; 90^\circ[$. Punkte Q_n liegen auf der Strecke $\overline{AM}$ mit $\overline{P_nQ_n} \perp \overline{AM}$. Die Dreiecke BCQ_n sind die Grundflächen der Pyramiden BCQ_nS mit der Spitze S und der Höhe $\overline{MS}$.

Zeichnen Sie die Strecken $\overline{MP_1}$ und $\overline{P_1Q_1}$ sowie die Pyramide BCQ_1S für $\varphi = 60^\circ$ in das Schrägbild zu A 2.0 ein.

2 P

A 2.3 Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Länge der Strecken $\overline{MP_n}$ in Abhängigkeit von φ

$$\text{gilt: } |\overline{MP_n}|(\varphi) = \frac{5,53}{\sin(\varphi + 52,13^\circ)} \text{ cm.}$$

Die Länge der Strecke $\overline{MP_0}$ ist minimal. Geben Sie den zugehörigen Wert für φ an.

3 P

A 2.4 Zeigen Sie rechnerisch, dass für die Länge der Strecken $\overline{MQ_n}$ in Abhängigkeit von φ

$$\text{gilt: } |\overline{MQ_n}|(\varphi) = \frac{5,53 \cdot \sin \varphi}{\sin(\varphi + 52,13^\circ)} \text{ cm.}$$

Berechnen Sie sodann das Volumen der Pyramide BCQ_1S .

3 P

A 3.0 Pfeile $\overrightarrow{OP_n}(\varphi) = \begin{pmatrix} 5 \cdot \sin \varphi \\ 5 \cdot \cos \varphi \end{pmatrix}$ und $\overrightarrow{OQ_n}(\varphi) = \begin{pmatrix} -2 \cdot \sin^2 \varphi \\ \frac{4}{\sin \varphi} \end{pmatrix}$ mit $O(0|0)$ spannen für $\varphi \in]0^\circ; 90^\circ]$ Dreiecke OP_nQ_n auf.

Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma.

A 3.1 Geben Sie für $\varphi = 80^\circ$ die Koordinaten der Pfeile $\overrightarrow{OP_1}$ und $\overrightarrow{OQ_1}$ an.
Zeichnen Sie sodann das Dreieck OP_1Q_1 in das Koordinatensystem zu A 3.0 ein.

2 P

A 3.2 Begründen Sie rechnerisch, weshalb die Länge der Strecken $\overline{OP_n}$ konstant ist.

2 P

A 3.3 Berechnen Sie das Maß des Winkels $\widehat{P_1OQ_1}$.

2 P

Aufgabe B 1

Haupttermin

- B 1.0 Gegeben ist die Funktion f_1 mit einer Gleichung der Form $y = \log_2(x + b) + 1$ ($b, x, y \in \mathbb{R}$). Der Graph zu f_1 schneidet die y -Achse im Punkt $P(0 | 3)$.
Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma.
- B 1.1 Zeigen Sie rechnerisch, dass die Funktion f_1 die Gleichung $y = \log_2(x + 4) + 1$ besitzt.
Zeichnen Sie sodann den Graphen zu f_1 für $x \in [-3,5; 6]$ in ein Koordinatensystem.
Für die Zeichnung: Längeneinheit 1 cm; $-6 \leq x \leq 6$; $-2 \leq y \leq 5$ 3 P
- B 1.2 Der Graph der Funktion f_1 wird durch Achsenspiegelung an der x -Achse sowie anschließende Parallelverschiebung mit dem Vektor $\vec{v} = \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ auf den Graphen der Funktion f_2 abgebildet.
Zeigen Sie rechnerisch, dass die Funktion f_2 die Gleichung $y = -\log_2(x + 6) + 2$ mit $x, y \in \mathbb{R}$ besitzt.
Zeichnen Sie sodann den Graphen zu f_2 für $x \in [-5,5; 6]$ in das Koordinatensystem zu B 1.1 ein. 3 P
- B 1.3 Punkte $A_n(x | \log_2(x + 4) + 1)$ auf dem Graphen zu f_1 haben dieselbe Abszisse x wie Punkte $C_n(x | -\log_2(x + 6) + 2)$ auf dem Graphen zu f_2 . Zusammen mit Punkten B_n sind sie für $x > -3,26$ die Eckpunkte von rechtwinkligen Dreiecken $A_n B_n C_n$ mit den Hypotenusen $\overline{B_n C_n}$. Es gilt: $|\overline{A_n B_n}| = 4 \text{ LE}$.
Zeichnen Sie in das Koordinatensystem zu B 1.1 die Dreiecke $A_1 B_1 C_1$ für $x = -1$ und $A_2 B_2 C_2$ für $x = 5$ ein. 2 P
- B 1.4 Zeigen Sie, dass für die Länge der Strecken $\overline{A_n C_n}$ in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte A_n gilt:
 $|\overline{A_n C_n}|(x) = \lceil \log_2(x^2 + 10x + 24) - 1 \rceil \text{ LE}$. 2 P
- B 1.5 Das Dreieck $A_3 B_3 C_3$ hat den Flächeninhalt 10 FE.
Bestimmen Sie rechnerisch die x -Koordinate des Punktes A_3 . 3 P
- B 1.6 Der Eckpunkt B_4 des Dreiecks $A_4 B_4 C_4$ liegt auf dem Graphen zu f_2 .
Berechnen Sie die x -Koordinate des Punktes B_4 . 4 P

Bitte wenden!

Aufgabe B 2

Haupttermin

B 2.0 Gegeben sind die Geraden $g: y = 0,25x - 3$ und $h: y = 0,6x$ ($x, y \in \mathbb{R}$).

Punkte $B_n(x | 0,25x - 3)$ auf der Geraden g bilden für $x > 1,57$ zusammen mit dem Punkt $A(0 | 0)$ und Punkten C_n und D_n Rauten $AB_nC_nD_n$, wobei die Gerade $h = AC_n$ eine der Symmetrieachsen der Rauten ist.

Runden Sie im Folgenden auf zwei Stellen nach dem Komma.

B 2.1 Zeichnen Sie die Geraden g und h sowie die Rauten $AB_1C_1D_1$ für $x = 2,5$ und $AB_2C_2D_2$ für $x = 7$ in ein Koordinatensystem.

Für die Zeichnung: Längeneinheit 1 cm; $-1 \leq x \leq 10$; $-4 \leq y \leq 8$

3 P

B 2.2 Ermitteln Sie rechnerisch die Koordinaten der Punkte D_n in Abhängigkeit von der Abszisse x der Punkte B_n .

[Ergebnis: $D_n(0,69x - 2,64 | 0,76x + 1,41)$]

3 P

B 2.3 Überprüfen Sie rechnerisch, ob die Raute $AB_2C_2D_2$ ein Quadrat ist.

3 P

B 2.4 Bestimmen Sie die Gleichung des Trägergraphen t der Punkte D_n .

Zeichnen Sie sodann den Trägergraphen t in das Koordinatensystem zu B 2.1 ein.

3 P

B 2.5 Der Punkt D_3 der Raute $AB_3C_3D_3$ liegt auf der y -Achse.

Zeichnen Sie die Raute $AB_3C_3D_3$ in das Koordinatensystem zu B 2.1 ein.

Berechnen Sie sodann die Koordinaten des Punktes C_3 sowie den Flächeninhalt der Raute $AB_3C_3D_3$.

[Teilergebnis: $x_{C_3} = 3,83$]

5 P

**inhaltlich unveränderte, an den
Zeichenkatalog des LehrplanPLUS
angepasste Fassung**

AUFGABE A 1: FUNKTIONEN

<p>A 1.1</p>	$2,50 = 2,20 \cdot \left(1 + \frac{p}{100}\right)^2$ <p>...</p> $\Leftrightarrow p = 6,60$ $f: y = 2,20 \cdot \left(1 + \frac{6,60}{100}\right)^x$ $f(7) = 2,20 \cdot \left(1 + \frac{6,60}{100}\right)^7$ <p>Eine Rose würde voraussichtlich 3,44 € kosten.</p>	<p>$p \in \mathbb{R}^+$</p> <p>$L = \{6,60\}$</p> <p>$x, y \in \mathbb{R}^+$</p> <p>$f(7) = 3,44$</p>	<p>3</p> <p>L 4 K 3 K 5</p>
<p>A 1.2</p>	$2 \cdot 2,20 = 2,20 \cdot \left(1 + \frac{6,60}{100}\right)^x$ <p>...</p> $\Leftrightarrow x = 10,85$ <p>Mia müsste im Jahr 2031 erstmals mehr als doppelt so viel für eine Rose bezahlen wie am 1. Juni 2020.</p>	<p>$x \in \mathbb{R}^+$</p> <p>$L = \{10,85\}$</p>	<p>2</p> <p>L 4 K 3 K 5</p>

AUFGABE A 2: RAUMGEOMETRIE

A 2.1	$\tan \sphericalangle ASM = \frac{9}{7}$	$\sphericalangle ASM = 52,13^\circ$	1	L 2 K 5
A 2.2	Einzeichnen der Strecken $\overline{MP_1}$ und $\overline{P_1Q_1}$ sowie der Pyramide BCQ_1S		2	L 3 K 4
A 2.3	$\frac{ \overline{MP_n} }{\sin 52,13^\circ} = \frac{7 \text{ cm}}{\sin(180^\circ - (\varphi + 52,13^\circ))}$ $ \overline{MP_n} (\varphi) = \frac{5,53}{\sin(\varphi + 52,13^\circ)} \text{ cm}$ Die Strecke $\overline{MP_0}$ erhält man für $\varphi = 37,87^\circ$.	$\varphi \in]0^\circ; 90^\circ[$	3	L 4 K 2 K 5
A 2.4	$\cos(90^\circ - \varphi) = \frac{ \overline{MQ_n} }{ \overline{MP_n} }$... $ \overline{MQ_n} (\varphi) = \frac{5,53 \cdot \sin \varphi}{\sin(\varphi + 52,13^\circ)} \text{ cm}$ $V(60^\circ) = \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 7 \cdot \frac{5,53 \cdot \sin 60^\circ}{\sin(60^\circ + 52,13^\circ)} \text{ cm}^3$	$\varphi \in]0^\circ; 90^\circ[$ $V(60^\circ) = 60,32 \text{ cm}^3$	3	L 2 L 4 K 2 K 5

AUFGABE A 3: EBENE GEOMETRIE

A 3.0				
A 3.1	$\overrightarrow{OP_1} = \begin{pmatrix} 4,92 \\ 0,87 \end{pmatrix}; \overrightarrow{OQ_1} = \begin{pmatrix} -1,94 \\ 4,06 \end{pmatrix}$ Einzeichnen des Dreiecks OP_1Q_1		2	L 3 K 4 K 5

A 3.2	$ \overline{OP_n} (\varphi) = \sqrt{(5 \cdot \sin \varphi)^2 + (5 \cdot \cos \varphi)^2} \text{ LE} \quad \varphi \in]0^\circ; 90^\circ]$ <p>...</p> $ \overline{OP_n} (\varphi) = \sqrt{25 \cdot (\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi)} \text{ LE}$ <p>Wegen $\sin^2 \varphi + \cos^2 \varphi = 1$ gilt folglich $\overline{OP_n} = 5 \text{ LE}$ für alle $\varphi \in]0^\circ; 90^\circ]$.</p>	2	L 4 K 1 K 5
A 3.3	$\cos \sphericalangle P_1 O Q_1 = \frac{4,92 \cdot (-1,94) + 0,87 \cdot 4,06}{5 \cdot \sqrt{(-1,94)^2 + 4,06^2}} \quad \sphericalangle P_1 O Q_1 = 105,50^\circ$	2	L 2 K 5
20			

Aufgabengruppe B

Haupttermin

AUFGABE B 1: FUNKTIONEN

B 1.1	$3 = \log_2(0 + b) + 1 \quad b \in \mathbb{R}$ <p>...</p> $\Leftrightarrow b = 4 \quad L = \{4\}$ $f_1: y = \log_2(x + 4) + 1 \quad x, y \in \mathbb{R}$	3	L 4 K 2 K 4 K 5

B 1.2	$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ -(\log_2(x+4)+1) \end{pmatrix} \quad x', y', x \in \mathbb{R}; x > -4$ $\Rightarrow y' = -\log_2(x'+4) - 1$ $\begin{pmatrix} x'' \\ y'' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ -\log_2(x'+4) - 1 \end{pmatrix} \oplus \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix} \quad x'', y'', x' \in \mathbb{R}; x' > -4$ <p>...</p> $\Rightarrow y'' = -\log_2(x''+6) + 2$ $f_2: y = -\log_2(x+6) + 2 \quad x, y \in \mathbb{R}$ <p>Einzeichnen des Graphen zu f_2</p>	3	L 4 K 4 K 5
B 1.3	Einzeichnen der Dreiecke $A_1 B_1 C_1$ und $A_2 B_2 C_2$	2	L 3 K 4
B 1.4	$ \overline{A_n C_n} (x) = [\log_2(x+4) + 1 - (-\log_2(x+6) + 2)] \text{ LE} \quad x \in \mathbb{R}; x > -3,26$ <p>...</p> $ \overline{A_n C_n} (x) = [\log_2(x^2 + 10x + 24) - 1] \text{ LE}$	2	L 3 L 4 K 5
B 1.5	$A(x) = 0,5 \cdot 4 \cdot [\log_2(x^2 + 10x + 24) - 1] \text{ FE} \quad x \in \mathbb{R}; x > -3,26$ $A(x) = [2 \cdot \log_2(x^2 + 10x + 24) - 2] \text{ FE}$ $10 = 2 \cdot \log_2(x^2 + 10x + 24) - 2 \quad x \in \mathbb{R}; x > -3,26$ <p>...</p> $\Leftrightarrow (x = -13,06 \vee x = 3,06) \quad L = \{3,06\}$	3	L 3 L 4 K 5
B 1.6	$B_n(x-4 \log_2(x+4)+1)$ $\log_2(x+4)+1 = -\log_2(x-4+6)+2 \quad x \in \mathbb{R}; x > -3,26$ <p>...</p> $\Leftrightarrow x = -1,27 \quad L = \{-1,27\}$ $x_{B_4} = -1,27 - 4 \quad x_{B_4} = -5,27$	4	L 3 L 4 K 2 K 5
			17

B 2.3	<p>Wenn die Raute $AB_2C_2D_2$ ein Quadrat wäre, so müsste gelten: $\overrightarrow{AB_2} \odot \overrightarrow{AD_2} = 0$.</p> $\overrightarrow{AB_2} = \begin{pmatrix} 7 \\ 0,25 \cdot 7 - 3 \end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{AB_2} = \begin{pmatrix} 7 \\ -1,25 \end{pmatrix}$ $\overrightarrow{AD_2} = \begin{pmatrix} 0,69 \cdot 7 - 2,64 \\ 0,76 \cdot 7 + 1,41 \end{pmatrix} \qquad \overrightarrow{AD_2} = \begin{pmatrix} 2,19 \\ 6,73 \end{pmatrix}$ $\begin{pmatrix} 7 \\ -1,25 \end{pmatrix} \odot \begin{pmatrix} 2,19 \\ 6,73 \end{pmatrix} = 6,92 \neq 0$ <p>Folglich ist die Raute $AB_2C_2D_2$ kein Quadrat.</p>	3	L 3 K 1 K 5
B 2.4	$\begin{cases} x_{D_n} = 0,69x - 2,64 \\ \wedge y_{D_n} = 0,76x + 1,41 \end{cases} \qquad x_{D_n}, y_{D_n}, x \in \mathbb{R}; x > 1,57$ <p>...</p> $\Rightarrow y_{D_n} = 1,10x_{D_n} + 4,32$ <p>Trägergraph: $y = 1,10x + 4,32$ $x, y \in \mathbb{R}$</p> <p>Einzeichnen des Trägergraphen t</p>	3	L 4 K 4 K 5
B 2.5	<p>Einzeichnen der Raute $AB_3C_3D_3$</p> $0,69x - 2,64 = 0 \qquad x \in \mathbb{R}; x > 1,57$ <p>...</p> $\Leftrightarrow x = 3,83 \qquad L = \{3,83\}$ $C_3(3,83 \mid 0,6 \cdot 3,83) \qquad C_3(3,83 \mid 2,30)$ $A_{AB_3C_3D_3} = \overline{AD_3} \cdot d(C_3; AD_3)$ $ \overline{AD_3} = (0,76 \cdot 3,83 + 1,41) \text{ LE} \qquad \overline{AD_3} = 4,32 \text{ LE}$ $d(C_3; AD_3) = 3,83 \text{ LE}$ $A_{AB_3C_3D_3} = 4,32 \cdot 3,83 \text{ FE} \qquad A_{AB_3C_3D_3} = 16,55 \text{ FE}$	5	L 2 L 3 K 2 K 4 K 5
17			

Hinweis: Bei einigen Teilaufgaben sind auch andere Lösungswege möglich. Für richtige andere Lösungen gelten die jeweils angegebenen Punkte entsprechend; die Anzahl der Punkte bei den einzelnen Teilaufgaben darf jedoch nicht verändert werden. Insbesondere sind Lösungswege, bei denen der (grafikfähige) Taschenrechner verwendet wird, entsprechend ihrer Dokumentation bzw. ihrer Nachvollziehbarkeit zu bepunktet.

Bei der Korrektur ist zu beachten, dass die Vervielfältigung der Lösungsvorlage zu Verzerrungen der Zeichnungen führen kann.